
Para identificar las aves observadas se debe contar con una guía apropiada, donde consultar, para poder identificar las aves observadas.

[En esta web se encuentra una abundante bibliografía al respecto.](#)

En forma complementaria a la *guía de aves* pueden usarse claves de identificación que permiten una aproximación al diagnóstico.

Por ejemplo: Si el ave observada tiene uñas largas, finas, arqueadas y la posterior más larga y estaba cantando, al mirar la clave de los órdenes lleva a sospechar que es un passeriforme.

Por lo tanto, faltaría encontrar a que familia corresponde. Para eso la clave de familias permite aproximarse más a la identificación.

El tercer paso sería dentro de esa familia y con una guía delante buscar la imagen del ave observada, con lo cual se llegaría al diagnóstico preciso.

Se aclara que aquí aparecen solamente órdenes y familias que se describen para Uruguay.

Para tener una idea general respecto al orden al que pertenece el ave en cuestión se emplea las siguientes claves que dan una aproximación a la identificación:

CLAVE DE LOS ORDENES

SPHENISCIFORMES:

Esternón con quilla.

Alas no aptas para el vuelo.

Acuáticas.

Nadan y zambullen.

Pelágicos.

Se encuentran en el territorio nacional por cansancio o golpeados luego de tormentas, también por contaminación.

RHEIFORMES:

Aves sin quilla en el esternón.

No vuelan.

Corren.

Plumas en alas con poco desarrollo.

Patas y cuello largo.

Cabeza proporcionalmente pequeña con respecto al cuerpo.

De gran tamaño.

TINAMIFORMES:

Esternón con quilla.

Alas aptas para el vuelo, vuelan poco.

Muy caminadoras.

Pulgar inexistente o muy pequeño que no llega al suelo.

Pico arqueado y agudo con cera en la base.

Pequeña membrana interdigital.

No nadadora.

Viven principalmente en praderas.

Rudimento de cola.

Pulgar inexistente o muy pequeño que no llega al suelo.

Plumaje críptico.

PODICIPEDIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo, pero vuelan poco, carretean.

Nadadoras y zambullidoras.

4 dedos con membranas laterales.

Caminan muy poco, erguidos.

Pico cónico.

Cola poco desarrollada.

Parecen patos.

PROCELLARIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo.

Membrana en los dedos anteriores (3).

Nadadores.

Pico sin láminas transversales en los bordes.

Aberturas nasales tubulosas.

PELECANIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo.

Los dedos (4) unidos por membrana.

ARDEIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo.

Membrana de la base en los dedos anteriores (3).

Pico largo.

Patas y dedos largos.

Cuello largo.

PHOENICOPTERIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo, con cuello extendido, en fila.

Membrana en los dedos anteriores (3).

Pico con láminas transversales en los bordes, quebrado en ángulo.

Tarsos y tibias muy largos.

Cuello largo

Se ven en aguas dulces y salobres.

Rosados.

ANSERIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo.

Membrana en los dedos anteriores (3).

Pico con láminas transversales en los bordes.

Tarsos y tibias muy cortos.

FALCONIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo. Muy voladoras.

Membrana de la base en los dedos anteriores (3).

Pico fuerte y curvado en el ápice. Con cera en la base.

Dedos con uñas curvas, largas y fuertes.

Carnívoras.

GALLIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo. Alas anchas.

Terrícolas y arborícolas.

Grandes con cabeza relativamente pequeña.

Plumas de la cabeza eréctiles.

Cara y gular coloreadas y sin plumas.

Pico de gallina.

Cola larga.

Dedos largos y fuertes.

Parecen pavas.

GRUIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo.

Membrana de la base en los dedos anteriores (3).

Pico fuerte.

Patas largas.

Cuello largo.

CHARADRIIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo.

Membrana en los dedos anteriores (3).

Pico largo y recto.

Alas largas, muy voladoras.

Patas largas.

Dedo posterior generalmente atrofiado.

COLUMBIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo.

Alas largas y agudas.

Caminadoras.

Robustas.

Patas cortas.

Uñas cortas y casi rectas.

Cabeza pequeña y redondeada.

Pico blando con gancho en la punta.

Cera en la base del pico.

Cuello corto.

Arrulladoras.

PSITTACIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo. Muy voladoras.

Vuelo batido y rápido.

Alas largas y agudas.

Patas cortas con dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás.

Trepan.

Generalmente dos dedos hacia atrás y dos hacia adelante.

Cabeza relativamente grandes.

Pico fuerte y marcadamente encorvado desde la base.

Mandíbula inferior corta.

Lengua corta y engrosada.

Alborotadores.

Verdes.

CUCULIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo. Alas cortas.

Generalmente dos dedos hacia atrás y dos hacia adelante.

Pico largo un poco curvo.

Patatas con dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás.

Cola simple y muy larga con plumas de diferente medida.

Coloración pobre.

STRIGIFORMES:

Plumas en la cabeza.

La mayoría nocturnas.

Ojos anteriores.

CAPRIMULGIFORMES:

Salen de noche.

Comen insectos.

Plumajes crípticos.

Cabeza grande.

Alas y cola larga.

APODIFORMES:

Siempre volando. A gran altura, rápido.

Alas curvas, finas y largas.

Patatas cortas con uñas finas.

Parecen golondrinas.

Color oscuro.

Pico corto.

TROCHILIFORMES:

Vuelo rápido, sonoro, ágil (aún hacia atrás).

Se mantiene estático en el aire.

Muy pequeños.

Brillo metálico en sus plumas.

Pico fino, largo que puede ser curvo.

Pequeñísimas patas.

CORACIIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo. Muy voladoras.

Patas muy cortas. Tres dedos hacia adelante y uno hacia atrás.

PICIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo. Muy voladoras.

Generalmente dos dedos hacia atrás y dos hacia adelante.

Pico recto y fuerte.

Lengua extensible y larga.

Cola de plumas agudas, muy duras y rígidas.

PASSERIFORMES:

Esternón con quilla.

Aptas para el vuelo. Muy voladoras.

Uñas algo largas, finas y arqueadas. La posterior más recta y larga.

Cantores.

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ESTA ES UNA CLAVE ORIENTATIVA PARA DIAGNOSTICAR UNA OBSERVACIÓN.

MUCHAS VECES DENTRO DE UN ORDEN NO TODAS LAS ESPECIES TIENEN LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESCRIBEN EN EL MISMO.

SE DESCRIBEN CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ORDEN QUE PUEDE TENER EXCEPCIONES.

CLAVE DE LAS FAMILIAS

Se mencionan únicamente los ordenes que tienen varias familias presentes en Uruguay.

ORDEN PROCELLARIFORMES (3 familias):

Familia hydrobatidae:

Pequeñas (19 cm. promedio).

Tubos nasales unidos por la línea media y orificios hacia adelante.

Tarsos largos.

Vuelo errático.

Revolotean sobre el agua con las patas colgando.

No planean.

Pelágicos. En tierra por heridas o tormentas.

Familia procellaridae:

Medianas (35 cm. promedio).

Doble tubo sobre el pico.

Tarsos cortos.

Planean poco.

Pelágicos. En tierra por heridas o tormentas.

Parecen gaviotas.

Familia diomedidae:

Grandes (más de 40 cm.).

Tubos nasales separados. Se abren a los costados del pico.

Muy planeadores a baja altura.

Alas muy largas y angostas.

Nadan.

Pelágicos. En tierra por heridas o tormentas.

Parecen enormes gaviotas.

ORDEN PELECANIFORMES (7 familias):

Familia sulidae:

Zambullen desde lo alto.

Alas estrechas y largas.

Cola con forma de cuña.

Pico recto, fuerte y agudo.

Membrana en los 4 dedos.

Familia phalacrocoracidae:

Bucean.

Erectos.

Secan las alas extendidas.

Pico bastante recto y largo con gancho apical.

Cola larga, rígida.

Cuello largo.

Cuatro dedos palmeados.

Familia anhingidae:

Pico agudo, recto y largo con el que lancean los peces.

Nadan con el cuerpo hundido y cuello y cabeza afuera.

4 dedos palmeados.

Familia fregatidae:

Recorren la costa volando.

No nadan.

Persiguen otras aves.

Alas largas y angostas.

Cola ahorquillada y larga.

Pico con gancho apical y largo.

4 dedos palmeados.

Bolsa gular roja inflable.

ORDEN ARDEIFORMES (3 familias):**Familia ardeidae:**

Vuelo lento, cuello recogido.

Pico agudo y largo.

Paras largas.

Dedos no palmeados.

Familia ciconiidae:

Parecidas a las garzas, más grandes.

Cuello extendido al volar.

Cara sin plumas, en algunas hasta el cuello.

Pico grueso y largo.

Patas largas.

Dedos no palmeados.

Familia threskiornithidae:

Vuelo rápido con cuello extendido.

Cuello largo.

Patas largas.

Dedos no palmeados.

Pico delgado, curvo y largo.

ORDEN ANSERIFORMES (2 familias):

Familia anhimidae:

Vuelo lento.

Planeadores.

Gritones.

Pico de gallina.

Cabeza proporcionalmente pequeña con copete nugal.

Alas anchas y largas, espolones.

Dedos largos no palmeados.

Familia anatidae:

Acuáticos.

Muy nadadores.

Zambullen.

Buenos voladores. Rápido y batido.

Patas cortas con 3 dedos palmeados.

Caminan.

Espejo alar.

Pico ancho, chato con uña apical.

ORDEN FALCONIFORMES (4 familias):

Familia cathartidae:

Carroñeros.

Alas anchas y largas.

Planean alto.

Grandes.

Cabeza descubierta.

Pico con gancho apical.

Patas gruesas con uñas pobres.

Familia accipitridae:

Diurnos.

Alas largas.

Vuelan rápido.

Coloración pobre.

Pico corto y curvo. Con cera.

Fuertes y largas uñas encorvadas.

Familia pandionidae:

Pescadora al vuelo.

Ala largas y anguladas.

Uñas largas y curvas.

Familia falconidae:

Parecen accipitridae.

Pico corto, curvo y bordes dentados. Con cera.

Cola larga.

ORDEN GRUIFORMES (3 familias):

Familia aramidae:

Gritón.

Al vuelo separa primarias.

Alas anchas y largas.

Color negruzco.

Pico apenas curvado, largo.

Cuello largo.

Patas largas.

Cola corta.

Familia rallidae:

Con quilla.

Alas aptas para el vuelo.

Alas cortas y redondeadas.

De día vuelan poco.

Cola corta que puede ser erecta.

Dedos (algunas lobulados) y uñas largas.

Vocalizaciones fuertes.

Algunas con escudete.

Familia cariamidae:

Terrícolas.

Patas largas.

Dedos cortos.

Corredoras.

Alas cortas, redondeadas.

Fuerte vocalización.

Pico parece de gallina.

Cuello largo.

Cola larga.

ORDEN CHARADRIIFORMES (13 familias):

Familia jacanidae:

Caminan sobre la vegetación flotante.

Pico corto con escudete.

Alas redondeadas con espolón.

Cola corta.

Patas y dedos muy finos y largos.

Familia rostratulidae:

Salen de noche.

Pico largo, curvo en el ápice.

Alas anchas.

Cola corta.

Dedos largos.

Familia haematopodidae:

En las costas.

Silban.

Color negro o blanco y negro.

Pico angosto, largo y rojo.

Cola corta.

Patas largas.

Alas largas.

Familia charadriidae:

Dedo posterior falta o es pequeño.

Pico corto, ápice más grueso.

Cabeza grande.

Patas de longitud regular.

Alas redondeadas con espolón.

Gritones.

Familia scolopacidae:

Tres dedos anteriores y uno posterior.

Cabeza menor que los anteriores.

Costeros.

Pico y patas muy largos.

Vuelo rápido.

Alas agudas.

Familia recurvirostridae:

Blancos y negros.

Pico recto o curvado hacia arriba. Largo y fino.

Cola corta.

Patas largas.

Dedos palmeados.

Familia Phalaropodidae:

Pico recto, fino y recto.

Dedos lobulados.

Alas agudas y largas.

Familia thinocoridae:

Terrícola.

Caminadora.

Patas cortas.

Posadas asemejan palomas, volando chorlos.

Plumaje críptico.

Cola corta.

Pico grueso y corto.

Familia chionididae:

Parecen palomas blancas.

Terrícolas.

Pico grueso y corto.

Cola corta.

Familia stercorariidae:

Costeros y pelágicos.

Agresivos con otras especies por alimentos.

Nadadoras.

Parecen gaviotas.

Parduscas.

Pico fuerte con gancho apical.

Alas largas y agudas con mancha blanca.

Timoneras centrales más largas.

Dedos palmeados.

Familia laridae:

Ambas mandíbulas de igual longitud o la superior algo más larga.

Cola cuadrada.

En general blancas.

Gancho apical poco macada.

Alas agudas y largas.

Dedos palmeados.

Familia sternidae:

Ambientes acuáticos.

Parecen gaviotas.

No nadan.

Zambullen.

Pico agudo y recto.

Alas largas y angostas.

Dedos palmeados.

Familia rynchopidae:

Rayan el agua para alimentarse.

Semejan gaviotines.

Pico largo con maxilar superior más corto.

Alas largas y delgadas.

Dedos palmeados.

ORDEN STRIGIFORMES (2 familias):

Familia tytonidae:

Nocturnas.

cara blanca con disco facial en forma de corazón.

Pico alargado y recto.

Patas largas con plumas.

Dedos cubiertos por pelos.

Familia strigidae:

La mayoría nocturnas.

Vuelo silencioso, lento.

Cabeza grande que puede tener "orejas".

Disco facial en forma redonda.

Pico curvo y corto.

Patas cortas con plumas.

Uñas curvas y largas.

ORDEN CAPRIMULGIFORMES (2 familias):

Familia nyctibiidae:

Nocturnos.

Cazan insectos al vuelo o al acecho.

Muy crípticos.

Cabeza y ojos grandes.

Pico pequeñísimo.

Gran boca.

Alas largas.

Cola larga.

Patas cortas.

Familia caprimulgidae:

Salen al crepúsculo y a la noche.

Vuelo silencioso.

Alas largas.

Plumaje críptico.

Cabeza relativamente grande.

Pico y cuello corto.

Gran boca con vibrisas.

Ojos rojizos en la noche.

Cola larga.

Patas cortas.

ORDEN PASSERIFORMES (26 familias):

Familia dendrocolaptidae:

Trepadores.

Arborícolas.

Trepan circundando el tronco.

Cola en punta, rígida y larga.

No se apoyan en la cola.

Vuelo rápido entre troncos.

Vocalización fuerte.

Color pardo.

Pico curvo.

Tres dedos adelante y uno atrás.

Familia furnariidae:

Vuelo pobre.

Vocalizaciones fuertes pero no armoniosas.

Generalmente pardos.

Pico fino.

Alas cortas y redondeadas.

Familia formicariidae:

Escondidos.

Poco vuelo.

Alas cortas y redondeadas.

Vocalización fuerte.

Pico fuerte con gancho apical.

Familia cotingidae:

Arborícolas.

Rápido vuelo.

Alas cortas alargadas.

Pico ancho, gancho apical.

Plumaje llamativo.

Familia tyrannidae:

Cazan al vuelo.

Alas largas.

Pico fino con pelos. Gancho apical.

Tarso largo.

Familia phytomidae:

Vocalización como quejido.

Comen brotes tiernos de árboles.

Pico grueso, corto con bordes dentados.

Alas cortas y redondeadas.

Familia hirundinidae:

Vuelo con planeos, rápido.

Alas largas y agudas.

Beben volando sobre la superficie del agua.

Perchan en cables y alambrados.

Cuello y pico corto.

Patas cortas.

Familia corvidae:

Ruidosos.

Movedizos.

Grandes.

Plumaje con azul.

Pico fuerte con pelos.

Cola redondeada, larga.

Familia troglodytidae:

Vuelos cortos y repetidos.

Alas redondeadas.

Movedizos.

Canto bastante armonioso.

Chicas.

Color pobre.

Pico fino, algo curvado y largo.

Cola erecta y corta.

Fuertes tarsos y dedos.

Familia mimidae:

Muy buen canto.

Esbeltas.

Pico algo curvo, fino.

Alas redondeadas y cortas.

Cola larga que se levanta.

Familia turdidae:

Muy buen canto.

Muy terrícolas.

Mueven la cola permanentemente.

Alas caídas. Largas y agudas.

Pico casi recto.

Familia motacillidae:

Terrícolas.

Caminan mucho.

Uña posterior llamativamente larga.

Plumaje críptico.

En época reproductiva vuelan verticalmente y caen planeando vocalizando.

Alas largas y agudas.

Pico recto y fino.

Familia sylviidae:

Arborícolas.

Posiciones llamativas al trepar.

Movedizas.

Buen canto.

Pequeños y esbeltos.

Pico fino y recto.

Cola muy larga que levanta.

Familia vireonidae:

Arborícolas.

Buen canto.

Agradables colores.

Generalmente oculto.

Familia ploceidae:

Ruidosos.

Bastante terrícolas.

Pico cónico, fuerte y corto.

Familia parulidae:

Arborícolas.

Inquietos.

Acrobáticos.

Buen canto.

Vistosos.

Pequeño tamaño.

Pico recto y fino.

Cola redondeada.

Familia thraupidae:

Frugívoros.

Arborícolas.

Buen canto.

Plumas vistosas.

Pico cónico y robusto

Alas agudas.

Familia emberizidae:

Granívoros.

Buen canto.

Pico cónico, robusto y corto.

Generalmente dimorfismo con machos vistosos.

Familia fringillidae:

Ruidosos.

Muy buen canto.

Pequeños.

Pico bastante largo y fino.

Colores vistosos.

Generalmente dimorfismo sexual.

Familia icteridae:

Ruidosos.

Movedizos.

Plumajes generalmente con negro.

Pico agudo, cónico y recto. Generalmente bastante largo.